

Düngeempfehlung im Garten:

# DOMOGRAN® 45

## Stickstoff- & Schwefeldünger – vielseitig in der Anwendung

**DOMOGRAN®45 ist ein grobkörniges Ammoniumsulfat, das kleine Ammoniumdepots bildet, die zu einer langanhaltenden Stickstoffwirkung beitragen.**

- Diese Anwendungsempfehlungen stellen nur Hinweise dar, wobei die jeweiligen Standortbedingungen und örtliche Erfahrungen zu beachten sind.
- Vorzugsweise für den Einsatz auf Böden mit guter Nährstoffhaltefähigkeit
- Ein wichtiges Kriterium für die Festlegung der Höhe des zu düngenden Stickstoffs ist der Gesamt-N-Gehalt des Bodens zu Vegetationsbeginn (N<sub>min</sub>) und der Boden pH-Wert.
- Entsprechend der Bodenart und auszubauenden Kultur, ergänzen Sie fehlende Nährstoffe wie Kalium, Phosphor, Magnesium und Kalzium sowie Mikronährstoffe mit geeigneten Düngemitteln.



Sie haben Fragen zum Produkt?  
Bitte senden Sie uns eine Nachricht.  
Vielen Dank!

[domogran.de](http://domogran.de)



|                     | Kultur   | Aufwandmenge in g/m <sup>2</sup> | Aufteilung der Gaben und Anwendungszeitraum                      |
|---------------------|--|----------------------------------|--|
| <b>Gemüse</b>       | Bohnen<br>Erbsen<br>Radies   | 30                               | ganze Gabe vor der Saat  |
|                     | Gurken, Tomaten<br>Paprika,<br>Zwiebeln<br>Möhren, Rettich<br>Petersilie<br>Salat, Spinat<br>Stangenbohnen | 50                               | 1/2 vor der Saat bzw. Pflanzung<br>1/2 als Kopfdüngung           |
|                     | Kartoffeln   | 30-60                            | ganze Gabe vor der Pflanzung                                     |
|                     | Kohlarten<br>Porree, Sellerie<br>Mangold<br>Kürbis<br>Meerrettich<br>Schnittlauch                          | 60-80                            | 1/3 vor der Saat bzw. Pflanzung<br>2/3 als Kopfdünger in 2 Gaben |
|                     | Rhabarber  | 60-80                            | 2/3 im März/ April<br>1/3 im Juni/ Juli                          |
|                     | Spargel  | 60-80                            | in 3 Gaben im Juni/Juli  |
| <b>Obst</b>         | Obstbäume<br>(Hauptertragszeit)  | 40                               | 1/2 im März/April<br>1/2 in der 1. Junihälfte                    |
|                     | Beerensträucher  | 50                               | 1/2 im März/April<br>1/2 im Juli/August                          |
|                     | Erdbeeren  | 50                               | 1/3 im März/April<br>2/3 im Juli/August                          |
|                     | Reben  | 20-30                            | März/April   |
|                     | Kulturheidelbeeren   | 40-60                            | je 1/2 im April und Juli<br>oder 1x als Düngerdepot              |
| <b>Zierpflanzen</b> | Sommerblumen   | 40                               | 2/3 vor der Saat bzw. Pflanzung<br>1/3 im Mai/Juni               |
|                     | Stauden, Rosen,<br>Ziersträucher   | 40                               | 2/3 im März/April<br>1/3 im Mai/Juni                             |
|                     | Rhododendron   | 40-60                            | je 1/2 im April und Juli<br>oder 1x als Düngerdepot              |
| <b>Grünflächen</b>  | Rasen  | 75                               | 3 Teilgaben von<br>April bis September                           |

Weitere Produktinformationen zur Anwendung in der Moosbehandlung im Rasen finden Sie im Blog unter [domogran.de](http://domogran.de)

Die Umrechnung der Menge Ware pro m<sup>2</sup> in Menge Stickstoff pro m<sup>2</sup> erfolgt durch die Division mit dem Wert 4,76. So werden mit 30 g DOMOGRAN®45/m<sup>2</sup> 6,3 g N/m<sup>2</sup> (63 kg N/ha) gedüngt.

#### Dosierempfehlung:



Tasse  
ca. 210 g



gestrichener Kaffeelöffel  
ca. 20 g



gehäufter Teelöffel  
ca. 5-9 g



gehäufter Esslöffel  
ca. 20-26 g